SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi
Dipartimento Attività Integrata
Dipartimento della Donna, del bambino e delle malattie urologiche
Unità Operativa Pediatria - Prof. A. Pession

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento Cure Primarie Area Dip.le Promozione Salute Donna e Bambino
UOC Pediatria Territoriale

L'iniezione di glucagone – Come iniettare il Glucagone

1) Rimuovere il coperchio del flacone con la polvere(senza toccare il gommino) e la protezione dell'ago della siringa

2) Iniettare il diluente nel flacone di Glucagone

3) Senza estrarre la siringa, agitare leggermente per consentire alla polvere di sciogliersi

4) Aspirare nella siringa la soluzione appena preparata

5) Iniettare: l'iniezione intramuscolare può essere effettuata alla coscia, al gluteo o al deltoide.

La fiala intera va riservata ai bambini di peso superiore ai 25 Kg; negli altri casi somministrare ½ fiala.

Nota: se il glucagone è conservato in frigorifero (2-8°C), nel contenitore sigillato protetto dalla luce con indicato nome e cognome del bambino, la durata è di 3 anni dalla data di preparazione.
Se il glucagone è conservato a temperatura ambiente (< 25°C), lontano da fonti di calore e luce solare, la sua durata si riduce a 18 mesi dalla data di preparazione.

agg.16/10/2015